

Introducción a los Números Algebraicos  
Lista 5 - entrega 29/10

58. (2p.) Sea  $A = (a_{i,j})$  una matriz  $m \times m$  con coeficientes reales tales que  $a_{i,i} > 0$  para todo  $i$ ,  $a_{i,j} < 0$  para todo  $i \neq j$ , y además todas las filas de  $A$  suman 0. Mostrar que  $A$  tiene rango  $m - 1$ .

59. Mostrar que el subconjunto de  $\mathbb{R}^n$  definido por la desigualdad

$$|x_1| + \cdots + |x_r| + 2 \left( \sqrt{x_{r+1}^2 + x_{r+2}^2} + \cdots + \sqrt{x_{n-1}^2 + x_n^2} \right) \leq n$$

es convexo. (Sugerencia: usar la desigualdad  $\sqrt{(a+b)^2 + (c+d)^2} \leq \sqrt{a^2 + c^2} + \sqrt{b^2 + d^2}$ .)

60. (a) Mostrar por inducción que

$$\frac{n^n}{n!} \geq 2^{n-1}.$$

(b) Concluir que

$$|\Delta(\mathcal{O}_K)| \geq 4^{r-1} \pi^{2s} > 1$$

61. (2p.) Mostrar que  $\mathbb{Z}[\sqrt{6}]$  es un dominio principal. (Sugerencia: para  $(2) = (2, \sqrt{6})^2$ , buscar un elemento con norma  $\pm 2$ ).

62. (2p.) Mostrar que hay dos clases de ideales en  $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ . (Sugerencia: no hay elementos de norma  $\pm 2$ , pero hay un elemento de norma 60).

63. (2p.) Mostrar que  $\mathbb{Z}[\sqrt{223}]$  tiene tres clases de ideales.

64. (3p.) Mostrar que el anillo de enteros en  $\mathbb{Q}[\sqrt{m}]$  es principal cuando  $m = -1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163$ .

65. Sea  $m$  un entero negativo libre de cuadrados, y supongamos que el anillo de enteros en  $\mathbb{Q}[\sqrt{m}]$  es principal.

(a) Mostrar que  $m \equiv 5 \pmod{8}$  excepto cuando  $m = -1, -2, -7$ . (Sugerencia: considerar un primo arriba de 2).

(b) Si  $p$  es un primo impar tal que  $4p < |m|$ , entonces  $m$  es no residuo cuadrático módulo  $p$ .

(c) Concluir que si  $m < -19$ , entonces  $m$  es congruente módulo 840 a alguno de

$$-43, -67, -163, -403, -547, -667.$$

66. (a) Mostrar que el grupo de clases de ideales de  $\mathbb{Z}[\sqrt{-14}]$  es cíclico de orden 4.

(b) Mostrar que el grupo de clases de ideales de  $\mathbb{Z}[\sqrt{-21}]$  es el grupo no cíclico de orden 4 (grupo de Klein).

67. (2p.) Probar que el anillo de enteros en  $\mathbb{Q}[\sqrt{-103}]$  tiene cinco clases de ideales. (Sugerencia: hay solo un ideal principal con norma 4 y solamente uno con norma 16).

68. (2p.) Probar que el anillo de enteros en  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{-3}]$  es principal. Notar que éste cuerpo contiene a  $\mathbb{Q}[\sqrt{-6}]$ ; ¿contraejemplo de qué es esto?
69. (a) Probar que  $\mathbb{Z}[\zeta_7]$  es un dominio de ideales principales.  
 (b) Probar que  $\mathbb{Z}[\zeta_7 + \zeta_7^{-1}]$  es un dominio de ideales principales.
70. (2p.) Mostrar que  $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$  es un dominio de ideales principales.
71. (a) Sea  $K$  un cuerpo de números,  $I$  un ideal de  $\mathcal{O}_K$ . Mostar que existe una extensión finita  $L/K$  en la que  $I$  se hace principal. (Sugerencia: alguna potencia de  $I$  es principal).  
 (b) Mostrar que existe una extensión finita  $L/K$  en la cual todo ideal de  $K$  se hace principal.  
 (c) Encontrar una extensión de grado 4 sobre  $K = \mathbb{Q}[\sqrt{-21}]$  en la que todo ideal de  $\mathcal{O}_K$  se haga principal.
72. Sea  $K = \mathbb{Q}[\alpha]$  con  $\alpha = \sqrt[3]{2}$ . Recordar que  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$ , y  $\Delta(\alpha) = -108$ .  
 (a) Mostrar que  $u^3 > 20$ , donde  $u$  es la unidad fundamental en  $\mathbb{Z}[\alpha]$ .  
 (b) Mostrar que  $\beta = (\alpha - 1)^{-1}$  es una unidad entre 1 y  $u^2$ ; concluir que  $\beta = u$ .
73. (a) Mostrar que  $x^3 + x - 3$  tiene una única raíz real  $\alpha$ , con  $\alpha > 1.2$ .  
 (b) Calcular  $\Delta(\alpha)$  y ver que es libre de cuadrados. Concluir que es igual a  $\Delta(\mathcal{O}_K)$  donde  $K = \mathbb{Q}[\alpha]$ .  
 (c) Determinar la unidad fundamental en  $\mathcal{O}_K$ .
74. Sea  $K$  una extensión normal de  $\mathbb{Q}$  con grupo de Galois  $G$ .  
 (a) Mostrar que  $K$  tiene grado 1 ó 2 sobre  $K \cap \mathbb{R}$ .  
 (b) Mostrar que  $K \cap \mathbb{R}$  es una extensión normal de  $\mathbb{Q}$  si y solo si todos los monomorfismos de  $K \cap \mathbb{R}$  son reales.  
 (c) Mostrar que  $\mathcal{O}_K^\times / (\mathcal{O}_K^\times \cap \mathbb{R})$  es finito si y solo si la conjugación compleja está en el centro de  $G$ .
75. Sea  $m \geq 3$ .  
 (a) Mostrar que
 
$$1 - \zeta_m^k = -2i\zeta_{2m}^k \operatorname{sen}(k\pi/m).$$
 para todo  $k \in \mathbb{Z}$ ; concluir que
 
$$\frac{1 - \zeta_m^k}{1 - \zeta_m} = \zeta_{2m}^{k-1} \frac{\operatorname{sen}(k\pi/m)}{\operatorname{sen}(\pi/m)}.$$
 (b) Mostrar que si  $k$  y  $m$  no son ambos pares, entonces  $\zeta_{2m}^{k-1} = \pm \zeta_m^h$  para algún  $h \in \mathbb{Z}$ .  
 (c) Mostrar que si  $k$  es coprimo con  $m$  entonces
 
$$u_k = \frac{\operatorname{sen}(k\pi/m)}{\operatorname{sen}(\pi/m)}$$
 es una unidad en  $\mathbb{Z}[\zeta_m]$ .